

EXERCÍCIOS

Exercícios

1. No que se refere a Programa Nacional de Imunização, julgue os itens que se seguem. Os vírus inativados compõem as vacinas contra poliomielite, sarampo e febre amarela.
 - Verdadeiro
 - Falso

2. As vacinas contra raiva, tétano, difteria e hepatite B podem ser administradas em gestantes, dado não ocasionarem risco ao feto.
 - Verdadeiro
 - Falso

No que se refere a Programa Nacional de Imunização,
julgue os itens que se seguem

3. A vacinação é contraindicada a pessoas portadoras de doença tratada com corticosteroides, quimioterapia antineoplásica ou radioterapia.

- Verdadeiro
- Falso

4. A imunização de pacientes portadores do vírus HIV sintomáticos deve abranger a vacina BCG.

- Verdadeiro
- Falso

5. A atuação do profissional de enfermagem em saúde coletiva é de suma importância e deve estar fundamentada em princípios e práticas que priorizem a atenção à saúde e não à doença. Acerca desse assunto, julgue os itens que se seguem. O Programa Nacional de Imunizações (PNI) preconiza, para prevenir as formas graves de tuberculose, a vacinação com a BCG-ID em recém-nascidos, crianças no primeiro mês de vida e gestantes.

- Verdadeiro
- Falso

6. Acerca de imunizações, julgue os itens que se seguem. A vacina combinada é aquela composta por diferentes antígenos na mesma apresentação e a vacina conjugada é aquela que combina um antígeno polissacarídeo a uma proteína, obtendo uma resposta timo-dependente.

- Verdadeiro
- Falso

7. A vacina tríplice viral, contra sarampo, rubéola e caxumba, pode ser administrada em pacientes HIV-positivos, mesmo na presença de imunossupressão grave.

- Verdadeiro
- Falso

8. A imunização passiva pode ser adquirida com o uso de imunoglobulina humana de dois tipos: a normal e a específica. As gamaglobulinas hiperimunes, como as imunoglobulinas anti-hepatite B, antitetânica, anti-rábica e antivaricela zóster são obtidas de doadores selecionados ou especiais.

- Verdadeiro
- Falso

9. Sobre a vacina BCG, assinale a alternativa correta:

- A - A vacina BCG é administrada com a finalidade principal de prevenir as formas graves da meningite.
- B - A idade de vacinação recomendada é a partir de 02 meses de vida, ou peso superior a 3,0 kg.
- C - A vacina BCG é preparada com vírus vivos, a partir de cepas atenuadas do *Mycobacterium bovis*.
- D - Na ausência da cicatriz vacinal é indicada a revacinação seis meses após a primeira dose.
- E - A realização do teste tuberculínico é indispensável, antes da administração da vacina BCG.

10. Numere a coluna da direita com base nas informações relativas aos princípios ativos dos imunológicos da coluna da esquerda

1.vírus vivo atenuado	() vacina contra haemophilus influenza tipo b
2.bacilo vivo atenuado	() BCG
3.toxóide	() vacina dupla adulto
4.vírus inativado	() vacina contra hepatite A
5.polissacarídeo conjugado	() vacina tríplice viral

Assinale a alternativa que apresente a sequência correta da coluna da direita, de cima para baixo:

- a) 5, 2, 3, 4, 1
- b) 4, 2, 3, 5, 1
- c) 4, 3, 2, 5, 1
- d) 1, 2, 3, 4, 5
- e) 2, 4, 5, 1, 3

11. São vacinas que possuem em sua composição vírus vivo atenuado, de acordo com o Manual de Imunização do Ministério da Saúde:

- a) Vacina contra rubéola, caxumba e sarampo.
- b) Vacina contra difteria, tétano e coqueluche.
- c) Vacina contra tuberculose e Influenza.
- d) Vacina contra hepatite B.
- e) Vacina contra tuberculose.

12. Assinale a alternativa que contém contra-indicações gerais à vacinação.

- a) Má-formação congênita, desnutrição e diarréia leve.
- b) Desnutrição, neoplasia maligna e aleitamento materno.
- c) Aleitamento materno, escabiose e desnutrição.
- d) Neoplasia maligna, corticoterapia imunossupressora e reação anafilática após recebimento de uma dose de vacina.
- e) Diarréia leve, desnutrição e escabiose.
- e) O volume da dose a ser aplicada corresponde a 0,5 ml.

13. A vacina BCG (Bacilo de Calmette e Guerin) é administrada com a finalidade principal de prevenir as formas graves de tuberculose (miliar e meníngea). Com relação a essa vacina, é correto afirmar:

- a) Na vacinação de rotina é contra-indicada para crianças com peso inferior a 2 kg.
- b) São administradas 3 doses no primeiro ano de vida.
- c) As doses podem ser administradas pela via subcutânea (SC).
- d) Alguns estados do Brasil utilizam uma dose de reforço para mulheres em idade fértil.

GABARITO

1. F
2. V
3. V
4. F
5. F
6. V
7. F
8. V
9. D
10. A
11. A
12. D
13. A

