

# Exercícios

1. Visando ao tratamento com o esquema de Poliquimioterapia, a classificação operacional do caso de Hanseníase é baseada no número de lesões cutâneas sendo a forma Paucibacilar casos que apresentem:

- A. até cinco lesões de pele.
- B. mais de seis lesões de pele.
- C. mais de cinco lesões de pele.
- D. mais de sete lesões de pele.
- E. até sete lesões de pele.

2. Portador de hanseníase multibacilar, com quimioterapia iniciada há apenas dois dias, foi internado para tratamento de crise hipertensiva. Diante desse caso, é recomendável instituir-se:
- A. **precauções padrão.**
  - B. isolamento respiratório para gotículas.
  - C. isolamento respiratório para aerossóis.
  - D. isolamento de contato.
  - E. isolamento protetor.

3. Nas orientações ao cliente com hanseníase, o enfermeiro deve:

- A. orientá-lo, no momento da cura, sobre a possibilidade do surgimento de episódios reacionais.
- B. restringir as respostas às perguntas sobre o tratamento e delegar ao psicólogo e assistente social os demais questionamentos sobre o autocuidado.
- C. restringir as explicações sobre a doença para os casos em que existe risco de vida ao cliente.
- D. dar uma informação que tranquilize o cliente, mesmo que não corresponda à verdade.
- E. evitar informar ao cliente sobre o seu diagnóstico e prognóstico devido ao estigma da doença.

4. Em relação aos cuidados com os pés de portadores de Hanseníase, leia as frases abaixo e a seguir assinale a alternativa que corresponde a resposta correta:

- I- Realizar a higiene dos pés com limpeza e secagem dos espaços interdigitais e cortar as unhas.
  - II- Realizar hidratação e lubrificação dos pés.
  - III- Não realizar remoção dos calos, pois podem causar a úlcera plantar.
  - IV- Deve ser orientada a diminuição do tamanho dos passos e a velocidade da marcha, diminuindo, assim, a fase de impulsão e as áreas de hiperpressão, incentivando o paciente a andar descalço para evitar a úlcera plantar.
- A. Todas as frases estão corretas.
  - B. As frases III e IV estão corretas.
  - C. As frases I, II e IV estão corretas.
  - D. As frases I e II estão corretas.**
  - E. Todas as frases estão incorretas.

5. Em relação à Hanseníase, assinale a alternativa correta:

- A. A vacina de BCG (Bacilo Calmette-Guerin), deverá ser aplicada nos contatos intradomiciliares, sem presença de sinais e sintomas de Hanseníase, no momento da avaliação, independentemente de serem casos de Paucibacilar ou Multibacilar.
- B. O Enfermeiro deve fornecer orientação de que a BCG é uma vacina específica para este agravo, sendo prioritária para os contatos intradomiciliares e portadores da doença.
- C. O tratamento com Rifampicina e Clofazimina pode acarretar ictiose, efeitos cutâneos, gastrointestinais, hepáticos e hematopoéticos, sendo chamados de reações hansênicas.
- D. A ocorrência de reações hansênicas contraindica o início da Poliquimioterapia/OMS e implica na sua interrupção.

6. De acordo com o que preconiza o Ministério da Saúde, qual das formas da hanseníase está relacionada corretamente ao tempo de tratamento?

- A. Indeterminada – 12 meses
- B. **Tuberculoide – 6 meses**
- C. Dimorfa – 6 meses
- D. Virchowiana – 6 meses
- E. Dimorfa – 4 meses

7. Segundo a Portaria nº 3.125, de 7 de outubro de 2010, que aprova as Diretrizes para Vigilância, Atenção e Controle da Hanseníase, em contatos intradomiciliares de casos de Hanseníase, a administração da vacina BCG (Bacilo de Calmette-Guérin) é indicada

- A. somente aos contatos intradomiciliares com menos de 1 ano de idade.
- B. aos contatos intradomiciliares que apresentem sinais e sintomas de hanseníase.
- C. aos contatos intradomiciliares, sem sinais e sintomas de hanseníase, no momento da avaliação, que apresentem ou não uma única cicatriz vacinal de BCG e em crianças menores de um ano não vacinadas.
- D. aos contatos intradomiciliares, mesmo sem sintomas da hanseníase, que apresentem duas cicatrizes vacinais de BCG.
- E. aos contatos intradomiciliares com mais de 20 anos de idade.

8. Qual dos exames a seguir pode ser realizado como auxílio no diagnóstico da hanseníase?

- A. Eletroencefalograma
- B. Espirometria
- C. **Eletroneuromiografia**
- D. Densitometria óssea
- E. Ressonância magnética

9. De acordo com o Ministério da Saúde, a Hanseníase é uma doença infecto-contagiosa, de evolução lenta. A hanseníase manifesta-se através de sinais e sintomas dermatológicos e neurológicos. Não são considerados sinais e sintomas dermatológicos:

- A. Manchas pigmentares ou discrômicas.
- B. Placa.
- C. Tubérculo.
- D. Mancha de Montgomery.

10. A hanseníase é uma doença causada pelo *Mycobacterium leprae* e...

- A. é transmitida de pessoa doente sem tratamento para outra através das vias respiratórias e contaminação orofecal.
- B. acomete homens, mulheres e crianças a partir dos 12 anos, com prevalência para a raça branca.
- C. tem como característica a presença de incapacidades e/ou deformidades, quando não tratada ou com tratamento tardio.
- D. a manifestação dos primeiros sintomas ocorre entre 1 a 2 anos após o primeiro contato.
- E. o comprometimento dermatológico e neuropsiquiátrico decorre da lesão dos pares de nervos cranianos.

11. D. Maria, 59 anos, em tratamento de hanseníase multibacilar, na 2<sup>a</sup> dose de poliquimioterapia (PQT), compareceu à Unidade Básica de Saúde próxima de sua residência queixando-se de alteração na coloração da pele, enfatizando que possuía a pele escura, contudo a cor se acentuou bastante após a tomada da medicação para a hanseníase. A enfermeira a orientou informando que provavelmente essa alteração na cor da pele seria um efeito colateral do medicamento utilizado na PQT, a

- A. prednisona.
- B. dapsona.
- C. rifampicina.
- D. clofazimina.

12. A hanseníase é uma doença milenar, infectocontagiosa, causada pelo *Mycobacterium leprae*, que se manifesta através de sinais e sintomas dermatono neurológicos. Sobre essa doença, é correto afirmar que:

- A. sua transmissão ocorre através do contato com lesões contaminadas.
- B. a classificação utilizada pela OMS para a Poliquimioterapia (PQT) distribui os doentes em dois grupos: tuberculoide e paucibacilar.
- C. é um mal que tem evolução lenta, baixa infectividade e alta patogenicidade.
- D. as pessoas que adoecem de hanseníase e apresentam resistência bacilar são denominadas de paucibacilares.
- E. no Brasil, a prevalência da doença atinge os números mais elevados na região sul.

13. A hanseníase é uma doença de notificação compulsória em todo território nacional e de investigação obrigatória. Para definição de caso a pessoa deve apresentar um ou mais dos seguintes sinais cardinais e que necessita de tratamento poliquimioterápico:

- I – Lesão e/ou área da pele com diminuição ou alteração de sensibilidade.
- II – Acometimento de nervo periférico, com ou sem espessamento associado a alterações sensitivas e/ou motoras e/ou autonômicas.
- III – Cultura de escarro positiva.
- IV – Baciloscopia positiva de esfregaço intradérmico.
- V – Ptiríase versicolor.

Todos os itens CORRETOS estão em:

- A. III - IV - V
- B. I - II - III
- C. II - III - V
- D. I - II - IV

A hanseníase é fácil de diagnosticar, de tratar e tem cura, no entanto, quando diagnosticada e tratada tarde pode trazer graves consequências para os portadores e seus familiares, pelas lesões que os incapacitam fisicamente. Um caso de hanseníase é confirmado quando uma pessoa apresenta:

- A. Alteração de sensibilidade dolorosa, manchas discrômicas mesmo o resultado da baciloscopia sendo negativo, pois a clínica é soberana;
- B. Lesões de pele, baciloscopia positiva e sorologia positiva;
- C. Alteração de sensibilidade, manchas pigmentares ou discrômicas, acometimento de nervos, sorologia negativa;
- D. Lesões de pele com alteração de sensibilidade, acometimento de nervos com espessamento neural e baciloscopia positiva.