

EXERCÍCIOS

1. A assistência ao paciente na recuperação anestésica deve ser direta e intensiva por parte do enfermeiro e o atendimento deste deve incluir:

- A - Prescrição de fármacos para alívio de sintomatologia - pós-operatória
- B - Verificação do prontuário médico focando diagnóstico clínico
- C - Auxílio nas condutas cirúrgicas realizada pelo cirurgião
- D - Avaliação e manutenção do nível respiratório com instalação de oxigênio se necessário
- E - Administração de agentes anestésicos inalatórios durante a recuperação do paciente

2. Os sinais e sintomas que podem definir um choque hipovolêmico na RA incluem

- A - Pulso forte e rápido, respiração profunda e lenta e agitação psicomotora
- B - Pele úmida e quente, supuração, pulso rápido e periférico e palidez cutânea
- C - Depressão sensorial, lábios e unhas cianóticas e aumento do débito cardíaco e respiratório
- D - Débito urinário abaixo de 25 ml/h, pulso periférico filiforme e irregular e palidez facial
- E - Pressão arterial diastólica abaixo de 25 mmHg, pele úmida e fria e pulso periférico regular

3. As ações de enfermagem para atender um paciente com sinais de choque hipovolêmico na RA inclui:

- A - Coletar amostra de sangue para verificar tempo de sangramento (TS) e tempo de coagulação (TC)
- B - Aplicar calor local intercalado com compressas frias para regular temperatura corporal
- C - Administrar medicação vasodilatadora para diminuir débito cardíaco que deverá estar aumentado
- D - Infusão de solução de Ringer Lactato ou Soro Fisiológico para reposição volêmica
- E - Incentivar o paciente a manter micção espontânea para avaliar o débito urinário

4. O período pós-operatório imediato é considerado crítico porque envolve vários riscos a que o paciente está sujeito, entre eles podemos citar

- A - Consciência mantida ou recuperada
- B - Saturação de oxigênio dentro dos limites normais
- C - Diminuição dos reflexos protetores
- D - Estabilidade hemodinâmica
- E - Estabilidade da temperatura corporal

5. A dor pós-operatória pode ser definida como

- A - Dor aguda também chamada de dor nociceptiva
- B - Dor aguda também chamada de dor reflexa
- C - Dor crônica também chamada de dor pós-cirúrgica
- D - Dor crônica também chamada de dor psicológica
- E - Dor crônica também chamada de dor por lesão tecidual ou cicatriz cirúrgica

6. Entre os fatores relacionados à dor pós-operatória podemos citar:

- A -Resposta orgânica e sensitiva devido ao procedimento invasivo
- B - Natureza da patologia clínica do paciente associado aos aspectos sócio econômicos
- C - Tempo reduzido das cirurgias
- D - Cirurgias ambulatoriais
- E - Estabilidade dos sinais vitais

7. A prevalência de soluções no paciente que está em recuperação anestésica pode estar associado a:

- A - Irritação direta do nervo motor que enerva os músculos do pescoço e tórax
- B - Espasmo inspiratório intermitente com súbito fechamento da glote devido causas diretas ou reflexas
- C - Estimulação inspiratória ocasionada por ações de anestésicos endovenosos
- D - Irritação da glote normalmente por causa indireta relacionada a toxemia e uremia
- E - Ocorre após cirurgias abdominais e necessitam de tratamento medicamentoso para reverter o quadro

8. Náuseas e Vômitos incoercíveis no paciente em recuperação pós-operatória aumentam o risco para:

- A - Ruptura da musculatura abdominal
- B - Lesão e estimulação do diafragma
- C - Tensionamento da incisão e deiscência cirúrgica
- D - Espasmos involuntários da glote
- E - Aumento do débito cardíaco

9. A infecção do sítio cirúrgico (ISC) pode estar relacionada a:

- A - Material contaminado usado na cirurgia
- B - Despreparo do pessoal de enfermagem no cuidado ao paciente
- C - Técnica cirúrgica inadequada
- D - Ambiente hospitalar com higienização precária
- E - Todas as alternativas estão corretas

10. Os profissionais de saúde envolvidos na dinâmica da assistência ao paciente, especialmente os de enfermagem, focados no “fazer” em saúde, são os que se encontram mais suscetíveis a acidentes de trabalho, sendo correto afirmar:

- A - Acidentes como quedas e escorregões são os mais comuns durante o trabalho da equipe de enfermagem
- B - Acidentes químicos são considerados o primeiro em incidência para os trabalhadores de enfermagem
- C - Acidentes térmicos e químicos são comuns entre os profissionais de enfermagem
- D - Acidentes com materiais biológicos são considerados os principais na enfermagem
- E - Acidentes radioativos são comuns durante o trabalho de assistência de enfermagem

GABARITO

1. D
2. D
3. D
4. C
5. A
6. A
7. B
8. C
9. E
10. D

